



• ERABLES 31 •
La BIO en Haute-Garonne



• CIVAM Bio 09 •
Le groupement des Agriculteurs BIO de l'Ariège

Etude de 2 pratiques de désherbage sur la biodiversité du sol

Programme CASDAR-GIEE 2014-2017

« Comment maîtriser l'enherbement des exploitations
maraîchères biologiques de la vallée Arize-Lèze? »

Echanges de pratiques et de savoir-faire agro-écologiques pour
améliorer et conforter les performances technico-économiques des
exploitations maraîchères biologiques et ainsi répondre aux
demandes locales de légumes biologiques

10 novembre 2016 à Théza (66)





• ERABLES 31 •

La BIO en Haute-Garonne



• CIVAM Bio 09 •

Le groupement des Agriculteurs BIO de l'Ariège

Etude des effets sur la biodiversité du sol:

- de la solarisation
- et du désherbage vapeur

- Vers de terre
- Araignées
en partenariat avec Yvan CAPOWIEZ,
Chercheur à l'INRA d'Avignon (84)
- Biomasse microbienne
- Activité de la biomasse microbienne
en partenariat avec Thibaut DEPLANCHE, ingénieur
Agronome Conseiller à Célesta-Lab (34)

Protocole solarisation

Ferme d'Angel ALEGRE et Isabelle BODINEAU à Pailhès (09)

Etat initial

Pommes de terre primeurs

19 mai



Solarisation

60 mm d'eau et bâche posée

14 juil. - 29 août



1 semaine après

Semis de radis

8 septembre



Témoin en culture:

courgettes, oignons et melons



Haricots verts et salades



Protocole désherbage vapeur

Ferme du GAEC En Ver't de Terre à Saint-Lizier (09)

Etat initial

Plants de poireaux

20 mai



Désherbage vapeur

mi-septembre



Après

Semis carottes

20 septembre



Témoin en culture:

tomates



Générateur Simox

Chauffe l'eau 2 fois

Vapeur à 180°C

Cloche de 5 m²

12 000 € neuf

5 minutes de pose


choux chinois, épinards, navets navets




Premiers résultats de la solarisation

Vers de terre

Abondance



Biomasse



=> le nombre et la biomasse de vers de terre augmentent régulièrement mais 8 semaines après mais on est encore loin de l'état initial

Biomasse microbienne et son activité

Limon sablo-argileux

	Témoin	Solarisation	Remarques
M.O.	5,5 % → 4,3 %	3,9 % → 6,1 %	Entre les 2 serres: sol identique à la base, teneurs inhabituelles pour ce type de sol => influence des apports de composts de déchets verts. Serre solarisée : hétérogénéité du sol
% C total constitué de B.M.	1,3 → 1,1	2 → 0,5	Normalement très stable => modification des conditions environnementales
B.M. mg/kg	428 → 288 -30%	441 → 189 - 60%	Forte dépréciation

=> la solarisation a affecté la biomasse microbienne



Résultats du désherbage vapeur

Vers de terre



Abondance

Biomasse



⇒ 1 semaine après un niveau similaire à l'état initial est retrouvé

Limon argilo-sableux

Biomasse microbienne et son activité

	Témoin	Désherbage vapeur	Remarques
M.O.	5 % → 4,2 %	4,7 % → 5%	Similaire
% C total constitué de B.M.	1,1 → 1,1	0,8 → 1,3	Normalement très stable Modification des conditions environnementales
B.M. mg/kg	337 → 274 -20%	213 → 375 + 76%	Augmentation du développement de la B.M.

⇒ Le désherbage à la vapeur a stimulé la biomasse microbienne